

Przygotowanie jelit do operacji laparoskopowej narządu rodneho.

Informacje dotyczące stanu zdrowia, które należy zgłosić lekarzowi kierującemu:

- nasilenie objawów choroby niedokrwiennej serca,
- nadciśnienie tętnicze,
- tętniak aorty,
- duszność w spoczynku,
- skłonność do krwawień (skaza krwotoczna),
- ciąża,
- krwawienie miesięczkowe występujące w dniu badania,
- uczulenie na leki,
- jaskra,
- choroby psychiczne.

Sposób przygotowania się do operacji

Na 7 dni przed zabiegiem należy:

Przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.

Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne - typu Aspiryna, Acard, Ticlid, itp. - powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem, który zlecił stosowanie w/w leków.

Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe - Sintrom, Syncumar, Acenocumaryl, Warfaryna - konieczny jest kontakt z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe i zmiana leków na heparynę niskocząsteczkową.

Trzeci i drugi dzień przed zabiegiem:

Dieta lekkostrawna bez świeżych owoców, warzyw, ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Nie należy spożywać w żadnej postaci owoców i warzyw pestkowych, takich jak winogrona, pomidory, kiwi, truskawki oraz pestek, siemienia lnianego i maku.

Ze względu na to, że przyjmowanie preparatu przeczyszczającego rozpoczyna się w południe w dniu poprzedzającym zabieg operacyjny, należy tak zaplanować czas, aby móc od tego momentu do czasu zgłoszenia się na oddział pozostać w domu.

Dzień przed zabiegiem:

Do południa dieta bez mleka, płynna – dokładnie zmiksowane zupy, tzw. zupa krem, kisiel, rosół. Nie należy pić soków owocowych i napojów gazowanych. Inne napoje można pić w dowolnej ilości.

1. W dniu poprzedzającym zabieg w godzinach popołudniowych 14.00-15.00 należy rozpocząć picie roztworu **Fortrans** 1 torebka rozpuszczona w 1 litrze wody, **razem 4 litry płynu** na 4 saszetki. Należy pić 1 szklankę co 15 min. W razie złej tolerancji (silne nudności) dopuszczalne jest wypicie mniejszej objętości roztworu lub przedłużenie czasu picia.
2. Preparat jest niesmaczny, zdaniem pacjentów łatwiej jest wypić roztwór schłodzony, z dodatkiem soku z cytryny.
3. Od momentu rozpoczęcia picia roztworu nic nie jemy aż do momentu wykonania zabiegu operacyjnego.
4. Można pić dowolną ilość NIEGAZOWANEJ wody, słabej herbaty, herbat ziołowych.
W trakcie picia roztworu Fortransu można pić inne płyny (woda, herbata).

Reakcją organizmu na przyjmowanie roztworu Fortransu będą liczne wypróżnienia, na koniec treścią płynną.

W przypadku trudności z przygotowaniem się do badania, w szczególności w przypadku pogorszenia samopoczucia w trakcie przygotowania, konieczny jest kontakt z lekarzem

W dniu zabiegu - na czczo !!!